

Über Lymphangiome der Achselhöhle.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium des

Herrn Professor Dr. O. Bollinger

Conservator des pathologischen Instituts

der

hohen medicinischen Fakultät in München


vorgelegt von

JULIUS SAGGAU,

approb. Arzt aus Altona.

München, 1885.

K. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei v. Dr. C. Wolf & Sohn.



Über Lymphangiome der Achselhöhle.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium des

Herrn Professor Dr. O. Bollinger

Conservator des pathologischen Instituts

der

hohen medicinischen Fakultät in München

vorgelegt von

JULIUS SAGGAU,

approb. Arzt aus Altona.

München, 1885.

K. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei v. Dr. C. Wolf & Sohn.

MEINEN LIEBEN ELTERN

in

herzlicher Dankbarkeit

gewidmet.



Wenn schon an und für sich die Lymphangiome zu den selteneren Geschwulstformen gerechnet werden, so muß man im Besonderen die Lokalisation derselben in der Achselhöhle als eine seltene bezeichnen. Um so mehr mag es demnach gerechtfertigt erscheinen, einen Fall von Lymphangiom der Achselhöhle zu beschreiben, einmal um einen so interessanten Fall auch in weiteren Kreisen bekannt zu machen und dann auch, um von Neuem die Aufmerksamkeit auf diese Geschwulstform zu lenken. — Im Sommer-Semester 1884 hatte ich Gelegenheit, in der unter der Leitung des Herrn Prof. Dr. Helferich stehenden hiesigen Poliklinik einen Fall von Lymphangiom der Achselhöhle zu sehen und es kam mir sehr erwünscht, als Herr Prof. Dr. Helferich mir diesen Fall zur Beschreibung überliefs. In Nachstehendem werde ich versuchen, zunächst ein möglichst klares Bild von diesem von mir beobachteten Fall zu entwerfen.

Adolf St., $7\frac{3}{4}$ Jahre alt, etwas zarter und anämischer, im Uebrigen aber gut genährter Knabe. Angeblich war derselbe nie krank, ebenso sind Eltern und Geschwister völlig gesund. Einige Wochen nach der Geburt des Knaben will die Mutter, als sie das Kind zum ersten Mal selbst badete, bemerkt haben, daß in der rechten Achselhöhle desselben eine weiche Geschwulst bestand, von der Gröfse einer kleinen Haselnufs. Da die Geschwulst in der nächstfolgenden Zeit weder

im Wachsthum noch sonst irgend welche Veränderung erlitt, ist wohl anzunehmen, daß sie in demselben Umfang schon bei der Geburt bestand und nur wegen ihres verborgenen Sitzes unbemerkt blieb. Bis vor ungefähr einem Jahr blieb die Geschwulst nach Aussage der Eltern völlig unverändert in Bezug auf Gröfse, Consistenz und Aussehen. Seit genannter Zeit soll dann die Gröfse langsam, im letzten halben Jahr aber auffallend schnell zugenommen haben. Hierdurch beunruhigt, suchten die Eltern ärztliche Hülfe auf und wurde ihnen gerathen, über der Geschwulst einen Korkdruckverband anzulegen. Letzterer vermochte aber nicht, das Weiterwachsen der Geschwulst zu verhindern, zumal schon, wie die Eltern selbst angeben, es ihnen nicht gelang, bei der ungünstigen Lokalisation der Geschwulst, den Verband derart zu fixiren, daß von einem wirklich gleichmäfsig ausgeübten Druck die Rede hätte sein können. — Herr Prof. Dr. Helferich, welcher dann zu Rathe gezogen wurde, diagnostisirte ein Lymphangiom, empfahl die gründliche Entfernung desselben durch Operation und vollführte letztere am 16. Juli vorigen Jahres.

Die äussere Befichtigung zeigt eine in der Mitte der rechten Achselhöhle befindliche, etwas auf den Oberarm übergreifende, gegen das umgebende Gewebe scharf abgegrenzte Geschwulst von Hühnereigröfse. Die Haut über derselben ist von einigen durchscheinenden Venen durchzogen, etwas verdünnt und transparent, ohne jegliche Teleangiectasieen. An einigen Stellen trägt sie Gruppen von 2—4 stecknadelkopf- bis hirsekorngröfsen, zum Theil frischen, zum Theil mit Krusten bedeckten, dem gewöhnlichen Herpes ähnlichen Bläschen, von denen erstere einen wasserhellen, durchscheinenden Inhalt haben. Entzündliche Röthung der Haut ist nicht vorhanden; überhaupt sind aufer den genannten keine Veränderungen der Haut mehr wahrzunehmen.

Die Geschwulst fühlt sich prall elastisch an, fluctuirend, nach links und rechts in geringem Mafse verschiebbar, ist aber nicht zusammenzudrücken. Bei Ausübung eines Drucks auf dieselbe macht sich ein Knistern bemerkbar, und drückt man auf die eine Seite, so wölbt sich die andere etwas knollig vor,

so dafs es den Anschein hat, als ob im Innern die Geschwulst getächert oder variköfen Baues sei. Aufserhalb der Muskelunterlage läfst sie sich völlig umgreifen, ist also von dieser getrennt.

Die Geschwulst macht weder spontan noch bei Druck Schmerzen; dagegen soll Druck oft starkes „Jucken“ hervor gebracht haben. Ein spontanes An- und Abschwellen der Geschwulst soll nicht stattgefunden haben; daselbe läfst sich auch nicht durch Husten, Schreien etc. erreichen.

Die Operation wurde in folgender Weise ausgeführt: Nach Durchtrennung der Haut durch einen ca. 5 cm. langen Längsschnitt über der Geschwulst zeigt sich ein mäfsig entwickeltes Fettpolster und unter diesem eine Fascie, deren Spaltung auf der Hohlfonde vorgenommen wird. Dabei ereignet es sich, dafs die darunter liegende Geschwulst angestoßen wird und ihr Inhalt in einem Strahl herausspritzt. Derselbe mag etwa einen Eßlöffel voll betragen haben, ist klar und schwach gelblich gefärbt. Es ist, wenn auch in diesem Fall nicht durchs Mikroskop bewiesen, der Inhalt zweifellos Lymphe. Nach vollständiger Spaltung oben genannter Fascie liegt die jetzt völlig collabirte Geschwulst deutlich vor und die oben erwähnte Verletzung ihrer Wandung erklärt sich jetzt leicht aus der auffallenden Dünnigkeit derselben. Durch äußerst sorgfältige Präparation gelingt es, die Geschwulst in toto aus dem umgebenden Gewebe herauszuschälen. Nachdem nun noch einige kleine Blutungen gestillt sind und die Bläschen tragenden Hautstückchen excidirt worden, wird die Wundhöhle sorgfältig mit 5prozentiger Carbollösung desinficirt, und nach Einlegung zweier Cautschoukdrains werden die Wundränder durch die Naht mit einander vereinigt. Darauf wird ein gut antiseptischer Verband angelegt und der Arm am Thorax durch Binden fixirt.

In den ersten Tagen nach der Operation sah ich den kleinen Patienten täglich und zwar im besten Wohlbefinden. Am 18. Juli, also am zweiten Tage nach der Operation, soll er nach Angabe des übrigens übertrieben ängstlichen Vaters gegen Abend »starkes Fieber« gehabt haben. Am anderen

Tage fand ich Pat. aber völlig wohl und fieberfrei, und in der Annahme, daß das angeblich stark gewesene Fieber wohl nur in einer vorübergehenden Unruhe des Pat. bestanden habe, die ihren Grund in längerer Stuhlverhaltung hatte, verordnete ich Ol. Ricini, welches prompt wirkte; und damit kehrte denn auch kein »Fieber« wieder.

Am 20. wurde zuerst der Verband gewechselt; gleich zeitig wurden die Drains und einige Nähte entfernt. Am 24. Entfernung der letzten Nähte, Heilung per primam intentionem. Um die frische Narbe vorerst noch gegen schädliche, äussere Einflüsse zu schützen, wird sie mit einem Wappolster bedeckt, welches noch einige Zeit getragen werden soll.

Die exstirpirte Geschwulst besteht makroskopisch aus der schon erwähnten bindegewebigen zarten Wandung, und im Innern sieht man die schon durch das Gefühl durch die Haut hindurch vermuthete Fächerung sehr deutlich. Durch von der Wand ausgehende kleinere Septa ist nämlich die ganze Geschwulsthöhle in kleinere bis bohnergroße Räume abgetheilt, die alle unter einander communiciren.

Die mikroskopische Untersuchung, die sich auf die Geschwulst selbst und auf die excidirten Bläschen tragenden Hautstückchen erstreckte, ergibt folgendes:

Die Grundsubstanz besteht aus zartem Bindegewebe, das stellenweise von mehr oder weniger Rundzellen durchsetzt ist. In diesem Gewebe sieht man zahlreiche Spalten und unregelmässig gestaltete Hohlräume, die sich deutlich als Lymphspalten und Lymphräume charakterisiren, die jedoch ihren Inhalt verloren haben. Hie und da sieht man reichliche Fettzellen in das Grundgewebe eingelagert und an einigen Stellen sind demselben offenbar glatte Muskelfasern beigemischt. Die stellenweise ausserordentlich reichlichen Anhäufungen von Rundzellen scheinen dafür zu sprechen, daß die Geschwulst noch im Wachsen begriffen war. An einigen Stellen fallen langgestreckte Zellhaufen auf durch ihre unregelmässige Form, die sehr an die der Lymphräume und Lymphspalten erinnert, und es liegt hier der Gedanke sehr nahe, daß diese Zellhaufen eine Vorstufe späterer Lymphräume darstellen, wie sie von Vir-

chow, Billroth und Winiwarter angenommen wird. — Die Schnitte durch die oben erwähnten Bläschen zeigen im Ganzen daselbe Bild wie die durch die Geschwulst selbst geführten. Auch hier findet sich ein sehr zartes Bindegewebe als Grundsubstanz, in der sich noch deutlicher die charakteristischen Lymphräume finden, die jedoch auch hier ihren Inhalt verloren haben. Ja, stellenweise findet sich hier noch deutlich das Endothel erhalten. Die Haut über dem Lymphangiom zeigt auch an den Stellen, wo die Bläschen sitzen, unter dem Mikroskop keine Veränderungen.

Durch die makroskopische und mikroskopische Untersuchung der exstirpirten Geschwulst ist also die klinische Diagnose: Lymphangiom zur Genüge bestätigt, und zwar haben wir den Tumor der unten folgenden Definition gemäß als *Lymphangioma cavernosum* zu bezeichnen.

Erwähnen möchte ich hier, daß sich einige Monate nach der Operation in der Umgebung der Narbe bereits neue Bläschen gebildet haben von gleicher Beschaffenheit wie die früheren.

Zur Vervollständigung des Bildes führe ich im folgenden die nur spärlich gefundenen weiteren Fälle von Lymphangiom der Achselhöhle mit theilweise recht ausführlichen näheren Angaben auf.

1. Fall. Xavier S., 7 J. alt, war stets gesund. Seit 1½ Jahren ist die Haut der rechten Achselhöhle der Sitz einer Geschwulst. Selbe zeigt sich als diffuse Schwellung, ohne Fluctuation, nach unten und vorn sich ausbreitend, ohne Röthung, mannesfaustgroß. Bei längerem Druck auf die Geschwulst geht sie zurück, um sich mit Nachlassen desselben langsam wieder zu füllen. Aehnliche Schwankungen kamen nach Aussage der Eltern spontan war.

Diagnose: Lymphangiom, bestätigt durch Probepunction.

Therapie. Zuerst Injection von reiner Jodtinctur in die Umgebung, dann in das kranke Gewebe selbst. — Vollständige Heilung durch narbige Schrumpfung nach mehrmonatlicher Fortsetzung dieser Behandlung.

2. Fall. Emma Kattemeyer, 12 Wochen. — Zwei-

faustgroßer Tumor der linken Achselhöhle, angeboren. — Exstirpation. — Tod 18 Stund. nach der Operation an Blutverlust.

3. Fall. Marie Backhahn, 29 J. — Dauer unbekannt. Zwei apfelgroße Geschwülste in der linken Achselhöhle resp. am Thorax. — Exstirpation der Tumoren. — Völlige Heilung. — Kein Recidiv.

4. Fall. Hedwig Valentin, 10 Monate, Macroglossie (Lymphangiom der Zunge) mit gleichzeitigen Geschwülsten in beiden Achselhöhlen, Unterkieferhöhle und Leistenrücken. Diese Geschwülste bezeichnet der Verfasser als Lymphangiomata racemosa (nach Virchow).

5. Fall. 44jähriger Küster. — Geschwulst in der rechten Achselhöhle, bedeckt von unveränderter, darüber leicht verschiebbarer Haut. — Exstirpation. — Tod durch Erysipelas 14 Tage nach der Operation. Präparat: Gröfse, kleine Männerfaust, Gestalt annähernd rundlich; grau weißliche, schlottrige, fetzige Masse, in der eine Art von Strängen vielfach durcheinanderläuft und sich verflechtet; dazwischen kleinere und gröfsere, zerdrückbar weiche Körper von dem Aussehen mit farbloser Flüssigkeit oder Gallerte gefüllter Blasen von Haselnufsgröfse bis feinsten, stecknadelkopfgrofsen, thautropfenähnlichen durchscheinenden Bläschen. Auf den Tisch hingebreitet breitet sich der Tumor als kuchenartige Masse aus. Unter Wasser flottirend entfaltet er sich zu einem äufserst zierlichen Netzwerk von feinen, weißlichen Strängen, die zum Theil gerade, zum Theil in vielfachen Windungen verlaufen und durch zahlreiche plötzliche An- und Abschwellungen ein exquisit rosenkranzartiges Aussehen bieten. Ueberwiegend ein gewisser Parallelismus der Hauptstämmchen, die allerdings wurmförmig gewunden in einer gemeinsamen Richtung verlaufen und sich durch äufserst zahlreiche Seitenäste mit einander verbinden und so ein dichtes Flechtwerk darbieten. Die erwähnten Blasen und Bläschen auf den ersten Blick als kleine mit durchscheinendem Inhalt gefüllte Cyten erscheinend, fassen den Strängen seitlich an oder in ihren Verlauf eingeschoben. — Inhalt zum Theil ganz farblos, weiche zitternde Gerinnfel, die mikroskopisch nur hie und da Lymphkörperchen und feine Körnchen

zeigten, oder in den Blasen wirkliche farblose, seröse Flüssigkeit, aus der sich dieselben Gerinnfel ausscheiden. Die sämtlichen Stränge erwiesen sich als wirkliche Kanäle, die mit den erwähnten Blasen in offener Verbindung stehen. Nach Aufschneiden einer Blase ist eine Sonde in das zu- und abführende Gefäß (zwei sehr feine Oeffnungen) durchführbar. — Form, Verlauf und Inhalt der Gefäße ergeben also ohne Zweifel, daß es sich um eine Geschwulst handelt, bestehend aus Lymphgefäßen mit zahlreichen Varicositäten und blasigen Ausbuchtungen (nach Virchow Lymphangioma racemosum).

Außer diesen 5 Fällen fand ich dann noch in Langenbecks Archiv Bd. XX einen Fall von Lymphangiom der Brust beschrieben, das sich mit einem Fortsatz in die Achselhöhle hineinerstreckt. Da aber nicht streng hierher gehörig, unterlasse ich es, das Nähere darüber anzuführen.

Ehe ich zu der allgemeinen Besprechung übergehe, habe ich noch vorauszuschicken, daß die Lymphangiome der Achselhöhle sich anderweitigen Lymphgeschwülsten gegenüber absolut nicht durch irgend ein Characteristicum auszeichnen, daß also das im Nachstehenden Gesagte für Lymphangiome im Allgemeinen und somit natürlich auch für die der Achselhöhle gilt. Die anzuführenden anatomischen und klinischen Eigenschaften habe ich im Wesentlichen aus Wegner's Abhandlung über Lymphangiome (Langenbeck's Archiv Bd. XX) zusammengestellt, in der sie auf's Genaueste abgehandelt werden, und habe ich das Hauptsächlichste aus ihr hier angeführt zum weiteren Verständniß oben aufgezählter Fälle.

Fragen wir uns zunächst nach der Aetiologie der Lymphangiome, so ist leider keine genügende Antwort darauf zu geben. Ist auch in einigen Fällen mit ziemlicher Sicherheit ein behinderter Abfluß der Lymphe als Entstehungsursache der Lymphangiome erwiesen, so ist doch in den meisten Fällen eine solche Ursache nicht nachgewiesen. Sie kommen vor, wie schon aus den oben angeführten Fällen ersichtlich, angeboren und erworben. In letzterer Form entstehen sie meist unmerklich ohne jegliche nachweisbare Ursache. In wenigen Fällen sollen sie durch Trauma entstanden sein. So berichtet

z. B. Nepveu von einem Fall von Lymphangiom der Zunge, das durch Biss auf dieselbe entstanden sein soll. — Abgesehen von den angeborenen haben die bis jetzt bekannten Fälle nichts ergeben, was für einen Einfluß des Alters oder des Geschlechts bei der Entstehung sprechen könnte.

Der Sitz der Lymphangiome ist sowohl in Bezug auf die äußere Körperfläche als auch auf das ihnen zur Grundlage dienende Gewebe sehr wechselnd. Auf Grund einer Reihe von Beobachtungen giebt Wegner folgende Orte an: Hals und Rücken (Hygroma colli et cervicis oder das Cystenhygrom) Zunge, Lippe und Wange (Macroglossie, chilie und melie) ferner Stirn, Achselhöhle, Brust, Schultern, Gefäß, Penis, Extremitäten (besonders Schenkelbeuge) Nieren und Mesenterium. Als Grundgewebe, in dem sie ihren Sitz haben, nennt er besonders das subcutane und das tiefe um die großen Gefäße befindliche Fettgewebe, ferner das submucöse Gewebe und von da in Haut und Muskeln übergehend. Meist solitär treten sie doch auch in einigen Fällen multipel auf (siehe oben Fall 3 und 4). Nach dem äußeren Aussehen können wir zunächst die Lymphangiome in zwei Hauptgruppen eintheilen, in die *circumscripten* und die *diffusen*, die beide in den oben angeführten Fällen vertreten sind. Selbstredend ergibt sich schon daraus, daß ihre GröÙe eine sehr verschiedene ist. Im Allgemeinen richtet sich wohl die GröÙe nach der Dauer des Bestehens, da wohl ein vorübergehendes Stillstehen im Wachsthum vorkommt, niemals aber bis jetzt ein spontanes Zurückgehen beobachtet wurde, vielmehr ein Fortschreiten im Wachsthum als Regel anzusehen ist.

Dem anatomischen Bau nach werden 3 Formen des Lymphangioms unterschieden: *Lymphangioma simplex*, *L. cavernosum* und *L. cystoides*.

Als *L. simplex* bezeichnet Wegner eine Gefäßgeschwulst, die im Wesentlichen zusammengesetzt ist aus Lymphräumen und Lymphgefäßen capillaren und größeren Kalibers, die in der Regel zu einem anastomosirenden Netzwerk angeordnet sind. Bei dieser Form handelt es sich nach seiner Ansicht, die auf sorgfältigster mikroskopischer Untersuchung

mehrerer Fälle beruht, wesentlich um eine Erweiterung präexistirender Lymphgefäße, und führt er diese Erweiterung auf ein Circulationshinderniß eines größeren Bezirks abfließender Lymphgefäße zurück, das wiederum seinen Grund in einer Obturation oder in einer mangelhaften Bildung von Lymphgefäßen hätte. Dabei fand er stets eine starke Hypertrophie des interstitiellen Bindegewebes, die er durch langsamere Abfuhr und durch längeres Verweilen der Lymphflüssigkeit in den Geweben erklärt, indem letzteres dadurch eine vermehrte Ernährung erhalte. — Als eine besondere Form des L. simplex erwähnt er eine Form, die Virchow nach Analogie des Aneurysma racemosum, *Lymphangioma racemosum* genannt hat (Fall 4 und 5, bei welch letzterem eine genauere Beschreibung). Das *Lymphangioma cavernosum* besteht nach Wegner aus einem Balkenwerk von Bindegewebe mit großentheils makroskopisch sichtbaren, mannigfach gestalteten und vielfach miteinander communicirenden Hohlräumen, mit Lymphe als Inhalt, so daß das Ganze einen schwammigen Bau hat. Unter den von dieser Art mikroskopisch untersuchten Fällen fand Wegner einmal die Entstehung der Geschwulst durch Lymphstauung (siehe oben), einmal durch Wucherung von den Wandzellen der präexistirenden Lymphcapillaren. Diese Wandzellen wucherten dann in das Zwischengewebe, bildeten große Zellhaufen, durch deren Canalifirung und Eröffnung in die alten Lymphbahnen sich dann neue Gefäße bildeten. Eine heteroplastische Bildung (z. B. aus Bindegewebe) konnte er auch hier nicht nachweisen. Auf eine solche deuten vielleicht die in dem von mir beschriebenen Fall erwähnten Zellstränge hin, bei denen nichts auf ein Entstehen aus den präexistirenden Lymphräumen hinweist, die vielmehr aus dem Bindegewebe hervorgegangen zu sein scheinen und deren Umwandlung in Lymphräume dann durch einen unten noch näher anzugebenden Proceß geschehen wäre. Ueber das Nähere dieser Form von Lymphangiom verweise ich auf den von mir beschriebenen Fall.

Die dritte Form, das *Lymphangioma cystoides* erscheint nach Wegner als ein Conglomerat geschlossener

Cysten, die von bedeutender Gröfse sein können. Regellos und scheinbar ohne Zusammenhang, ständen sie doch unter einander in Verbindung, da beim Anschneiden einer Cyste mehrere mit ihr collabiren. Dafs es sich in der That um Lymphangiome und nicht um Cysten handle, beweise der charakteristische Bau derselben und die, wenn auch nur sehr kleinen, aber doch deutlichen Communicationsöffnungen mit den Lymphgefäfsen. Gerade das letzte Moment sei wohl als Ursache dieser cystoiden Form anzusehen. Dafs alle drei Formen oft nicht scharf als solche charakterisirt sind und vielfach sich Uebergangsformen finden, zeigt sich schon daraus, dafs z. B. Virchow die Macroglossie als *L. cavernosum*, Wegner dagegen als *L. simplex* bezeichnet.

Das histologisch Charakteristische für Lymphangiome sind also Lymphe führende, mit Wandungen versehene Hohlräume, mit verschieden stark entwickeltem Zwischengewebe, das meist ein von elastischen Fasern durchzogenes fibröses oder Fettgewebe ist. In unserem Fall waren übrigens auch glatte Muskelfasern in dem Zwischengewebe vorhanden. Die Wandung ist gebildet von einer einfachen Lage platter endothelialer Zellen.

Für die histologische Entstehung oder Entwicklung ist ein dreifacher Modus anzunehmen. Der erste, auf Lymphstauung beruhend, ist oben bereits näher besprochen, der zweite, auf einer Proliferation der Lymphgefäfsendothelien beruhend, ist ebenfalls bereits erwähnt. Der dritte soll darauf beruhen, dafs aus bindegewebiger Matrix ein Granulationsgewebe entsteht und aus diesem durch secundäre Umwandlung auf indirektem Wege neue, lympheführende Räume sich bilden — heteroplastische Neoplasie (Virchow, Billroth, Winiwarter). Wie oben schon angedeutet, glaube ich, dafs das Ergebnifs der mikroskopischen Untersuchung in dem von mir beschriebenen Fall für eine solche heteroplastische Neoplasie spricht. Nach Winiwarter bekämen dann die Zellhaufen zunächst eine den Lymphfollikeln ganz ähnliche Form (wie sie in unserem Fall vorhanden war) und würden dann durch moleculären Zerfall und Flüssigkeitsaufnahme oder durch hydropische Degeneration zu neuen wirklichen Lymphräumen.

So viel über den Bau und die Entstehung der Lymphangiome. Ich habe jetzt zunächst noch Einiges über die Consistenz und den Inhalt derselben hinzuzufügen; denn beide sind, wie wir noch sehen werden, für die Diagnose nicht unwichtig.

Die Consistenz derselben ist äußerst verschieden; bald weich oder fluctuirend, auch wohl zusammendrückbar, sind sie in anderen Fällen wieder äußerst hart und geben einem ausgeübten Druck in keiner Weise nach. Wenn Wegner es als Seltenheit anführt, daß der Tumor von einer bindegewebigen Kapfel umgeben sei, die ihn scharf von der Umgebung abgrenze, so hätten wir einen dieser seltenen Fälle in dem unfrigen.

Der Inhalt der Lymphangiome ist in der Regel, wie schon der Name andeutet, Lymphe, und zwar wie wir oben in einigen Fällen gesehen, flüssige oder geronnene Lymphthromben, unter dem Mikroskop als blassee, homogene Schollen sich zeigend. Nach Lücke kann das Lymphangiom auch in Venen hineinwachsen und enthält dann gemischten Inhalt, lymphatischen und blutigen; auch Wegner erwähnt derartigen gemischten Inhalt, der dadurch entstehen soll, daß von irgend einem Punkt von rückwärts her sich das Blut durch die Lymphthromben einen Weg gebahnt habe; ja, es könne den Lymphthrombus so zum Verschwinden bringen, daß sich statt dessen in dem Hohlraum Blut befinde, das zuweilen sogar noch darin circulire. Einen sehr interessanten Fall, wo der Inhalt Chylus war, beschreibt Weichselbaum als Chylangiom in Virchows Archiv, Bd. 36.

Die durch das Lymphangiom hervorgerufenen Symptome sind ziemlich unbedeutend. Durchschnittlich zeichnet es sich durch ein langfames aber continuirliches Wachsen aus; zuweilen kann ein Stillstand in demselben eintreten, dem dann aber wieder ein weiteres und zwar beschleunigtes Fortschreiten zu folgen pflegt. In einigen Fällen beim Schreien, Husten, ausgeübtem Druck oder spontan An- und Abanschwellung zeigend, fehlen diese Erscheinungen in anderen Fällen gänzlich. Selten findet sich Pulsation oder ein entzündlicher Zustand der Haut

über demselben. In einigen Fällen besteht ein anhaltendes oder vorübergehendes Ausfließen von Lymphe (Lymphorrhoe). Ob das in dem von mir beschriebenen Fall häufig intensiv verspürte Jucken als ein Symptom des Lymphangioms anzusehen oder eine zufällige Complication war, ist schwer zu entscheiden; in keinem anderen Fall habe ich das gleiche Symptom erwähnt gefunden. Als sehr lästige Symptome können sich kosmetische Verunstaltungen, z. B. Macro-chiliemelie und glossie geltend machen; letztere kann sogar zu Sprach- und Schlingstörungen Veranlassung geben. Schließlich ist jede Geschwulst an sich für den Patienten deprimierend, und so kommt es dann, daß die Entfernung der Lymphangiome oft sehr erwünscht ist, wenn auch, wie gesagt, im Ganzen ihre Symptome sehr wenig sich geltend machen.

Die Diagnose auf Lymphangiome zu stellen, bietet in den meisten Fällen wohl wenig Schwierigkeit. Daß sie aber zuweilen auch zu diagnostischen Irrungen Anlaß geben können, zeigt sich daraus, daß schon die Diagnose in einem Fall auf Hernia inguinalis gestellt war, während die Obduction später zeigte, daß es sich um ein Lymphangiom handelte. Ob es sich um einen Absceß oder um ein Lymphangiom in einem Fall handle, wird hauptsächlich wohl durch Zuhilfenahme der Anamnese zu entscheiden sein. Schwieriger ist der Unterschied von anderen Tumoren, z. B. Angiomen, Lipomen und Myxomen, die ein ganz ähnliches Bild darbieten können. In so zweifelhaften Fällen würde es zu empfehlen sein, eine Probepunction auszuführen, die ja sehr leicht und ohne Gefahr für den Patienten gemacht werden könnte. Die genauere mikroskopische Untersuchung der dadurch gewonnenen Flüssigkeit wird jedenfalls bald zu einem sicheren diagnostischen Resultat führen. Im Ganzen ist bei der Diagnose der Lymphangiome die Anamnese besonders und neben ihr dann ein oder das andere der oben erwähnten Symptome in Betracht zu ziehen. Sehr einfach wird natürlich die Diagnose sein, wenn es sich um einen Tumor handelt, aus dem ein Lymphabfluß stattfindet.

Die Prognose der Lymphangiome ist im Ganzen günstig zu stellen. Eine maligne Degeneration kommt bei ihnen nicht vor, ferner keine Metastasen, und gründlich entfernt recidiviren sie auch nicht. Sie sind also zweifellos den gutartigen Tumoren zuzurechnen. Ferner haben wir auch schon gesehen, daß sie sehr langsam wachsen und im Ganzen wenig störende Symptome machen. Immerhin ist aber doch zu berücksichtigen, daß, wenn sich auch ihre Grösse in den meisten Fällen in gewissen Grenzen hält, sie doch zuweilen eine erhebliche Ausdehnung erreichen und dann bei ungünstigem Sitz durch Druck auf Gefäße oder Nervenstauungs- oder Lähmungsercheinungen zur Folge haben können. Als eine weitere Gefahr wäre noch die durch Trauma bedingte oder spontane Lymphorrhoe anzusehen, die, wenn hochgradig, durch den andauernden Säfteverlust zur Cachexie führen könnte. Aber auch dieser Ausgang ist gewiß äusserst selten, und als Regel hat man eine günstige Prognose der Lymphangiome anzunehmen.

Daß die Lymphangiome aber demnach eine Therapie erfordern, beruht in den schon angeborenen, zuweilen lästigen Symptomen, in dem unangenehmen Gefühl, eine Geschwulst am Körper zu tragen; und prophylactisch ist es angezeigt, eine Geschwulst zu entfernen, die immerhin doch die, wenn auch seltene, Möglichkeit darbietet, ernstere Störungen für den Träger herbeizuführen.

Zur Entfernung der Lymphangiome steht uns eine ganze Reihe von Methoden zur Verfügung, die mehr oder weniger eingreifend, schliesslich doch fast alle zum Ziel führen. Am wenigsten läßt sich letzteres sagen von der Compression. Der eine Fall von Heilung eines Lymphangioms der Schenkelbeuge durch Tragen einer elastischen Unterhose mit Pelotte, den Trélat anführt, ist doch etwas zweifelhaft, da der Patient bald nach der Heilung einer anderen Krankheit erlag, also eine andauernde Entfernung der Geschwulst dadurch nicht bewiesen werden konnte. In dem von mir beschriebenen Fall war der angewandte Korkdruckverband ohne Erfolg. In vielen Fällen würde eben die Localisation des Lymphangioms die Anbringung eines wirkfamen Druckverbandes gar nicht zulassen. Weitere Me-

thoden sind Incisionen, Punctionen und Cauterisationen, und kann man ja diese anwenden, wenn man einen energischeren Eingriff aus irgend einem Grunde zu fürchten hat.

Helferich erzielte übrigens bei einer Macroglossie ein vorzügliches Resultat durch die Ignipunctur, und wäre es demnach wohl zu empfehlen, diese Methode bei Macroglossieen weiter zu erproben. Die sonst am meisten in Anwendung kommenden Methoden sind Injectionen von reizenden Flüssigkeiten und die Exstirpation. Unter ersteren sind besonders angewandt Carbonsäure, Jodtinctur und Chlorzinklösung. Diese letztere empfiehlt besonders Maafs, indem er rath, die Höhle mit der Lösung auszuspülen und die Wände durch Reiben an einander innig mit ihr in Berührung zu bringen. Die Wirkung dieser genannten Flüssigkeiten ist eine entzündungserregende; durch die folgende narbige Schrumpfung verödet dann die Geschwulst. Wohl zu beachten ist aber dabei der Umstand, daß Injectionen von Jodtinctur und Carbonsäure zuweilen — besonders bei ausgedehnten Lymphangiomen — zur Vereiterung und Verjauchung mit ihren schlimmen Folgen führten, daß also die nöthige Vorsicht bei ihrer Anwendung nicht außer Acht zu lassen ist. — Aber einen Fehler haben alle bisher genannten Methoden (ausgenommen die Ignipunctur) gemeinlich nämlich den, daß sie, um wirklich zur radicalen Entfernung der Lymphangiome zu führen, eine häufige Wiederholung der Anwendung erfordern, ein Nachtheil, der sowohl den Patienten als auch den Arzt trifft. Will man eine sicher zum Ziel führende und dabei nur ein Mal anzuwendende Methode wählen, was selbstredend auch die richtigste ist, so vollführe man die Exstirpation und zwar am besten mit dem Messer, wenn in einigen Fällen auch vielleicht besser der Ecraseur in Anwendung kommen mag, worüber natürlich keine allgemein gültige Regel aufgestellt werden kann. Bei sorgfältiger Operation wird jedenfalls die radicale Beseitigung der Lymphangiome durch die Exstirpation in den meisten Fällen möglich sein. Bei gut a- und antiseptisch ausgeführter Operation wird die Prognose auch stets günstig sein; nur bei sehr jungen Kindern wird man stets den Blutverlust zu fürchten

haben, der in einigen Fällen den Tod nach der Operation zur Folge hatte.

Zum Schluß will ich nicht unterlassen, an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Helferich für die Anregung zu dieser Arbeit und Herrn Prof. Dr. Bollinger für die bereitwillige Unterstützung bei der mikroskopischen Untersuchung und für die Uebernahme des Präsidiums meinen aufrichtigen Dank abzustatten.



Literatur.

1. Fall, entnommen aus: „*Contribution à l'histoire des tumeurs lymphatiques par Charles Hartmann*“. Strassburger Dissertation 1880.
2. und 3. Fall, entnommen aus: „*Die chirurgische Klinik in Göttingen vom 1. Oktober 1875 bis 1. Oktober 1879*. (Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. XV.)
4. Fall, entnommen aus: „*Berichte aus der v. Langenbeck'schen Klinik, 1. Mai 1875 bis 1. Juli 1876* (Langenbecks Archiv, Supplementbd. zu Bd. XXI.)
5. Fall, entnommen aus: „*Wegners Abhandlung über Lymphangiome*“. (L. Archiv, Bd. XX.)

Zur weiteren Informirung über *Lymphangiome* möchte ich nur noch verweisen auf die schon öfter erwähnte Abhandlung von *Wegner* und auf den von *Weichselbaum* beschriebenen Fall von *Chylangiom*. (Virchows Archiv, Bd. XXXVI.)



